

**VLOEIBARE MESTSTOF VOOR BLADVOEDING****Product kenmerk**

Gehydrolyseerd diermeel voor meststof.



|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Uiterlijk:          | vloeibaar                     |
| Soortelijk gewicht: | 1 ltr = 1,25 kg               |
| Verpakking:         | jerrycan 25 kg<br>IBC 1250 kg |
| Werkzaam:           | direct                        |
| Periode:            | 10 dagen                      |

**Specifieke werking**

Verhoogt de resistentie.

De productiviteit neemt toe

Hechtingsproduct

Het product is hinderlijk voor dieren - konijnen / duiven.

**Specifieke eigenschappen****Factoren**

- Voeding
- De pH van de grond
- De bodemstructuur
- Het bodemleven

**Systemen**

- B-bak
- Druppelberegening
- Beregeningssystemen

**Zuivere plantenmest**

NPK Ca Mg Mn Cu B Zn Fe

**Specificatie**

|                                                            |       |
|------------------------------------------------------------|-------|
| Stikstof (N) totaal .....                                  | 9,00% |
| Fosforzuuranhydride (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) ..... |       |
| Kalium (K <sub>2</sub> O) totaal .....                     |       |
| Calcium (Ca) oplosbaar in mineraalzuur .....               |       |
| Magnesiumoxide (MgO) .....                                 |       |
| IJzer (Fe) .....                                           |       |
| Mangaan (Mn) .....                                         |       |
| Zink (Zn) .....                                            |       |
| Koper (Cu) .....                                           |       |
| Borium (B) .....                                           |       |
| Molybdeen (Mo) .....                                       |       |
| Silicium (Si) .....                                        |       |
| pH .....                                                   |       |

Meststof  
Gehydrolyseerd diermeel voor meststof

### **Garantie**

Stikstof (N) totaal ..... 9%

Waarvan:

\* Organisch gebonden stikstof oplosbaar in water 9%

\* = afkomstig van beender-, hoef- en hoornproducten welke gehydrolyseerd zijn.

*Product toegelaten door Verordening (EG) 889/2008 betreffende de biologische productiemethode.*

### **Bemestingsschema (indicatie):**

Bladmeststof: 4 kg per ha, herhalen om de 10 dagen 3 à 5 keer.  
100 à 300 g per 100 ltr water

Fertigatiemeststof: 3 à 5 kg per ha. 40 g per 100 m<sup>2</sup>

Druppelirrigatie: 3 à 5 kg per ha om de 15 dagen - concentratie 0,3% oplossing

### **Gebruiksmoment**

- Bij intensieve groeiperioden (jonge planten, vruchtvorming, knolvorming)
- Begin stoeling
- Moeilijke groeiperioden (droogte, parasitaire aantastingen)
- Bij plaagbestrijding 1 ltr bijmengen bij de eerste bespuitingen

### **Voorzorgsmaatregelen**

Altijd een oriënterende proef opzetten. Niet aanbrengen bij extreme weersomstandigheden en zeker niet in de volle zon. Bij voorkeur behandelen 's morgens vroeg of bij donker weer. De planten mogen geen droge potkluit hebben, de volle grond culturen moeten voldoende vochtig zijn. Niet spuiten op zieke of gebrekkige planten welke geen bladgroen verrichting meer doorgeven.

### **Opslagplaats**

Het product op een vorstvrije en schaduwrijke plaats opslaan tussen -2° C en +25°C. Voor gebruik de inhoud van vat of tank goed mengen.